


Bulletin de surveillance et de prévision d'échouement des sargasses pélagiques pour la Guadeloupe

Jeudi 10 Septembre 2020

Carte de risque d'échouement pour les 4 prochains jours :



Indice de confiance : 4 /5

Zone	Estimation du Risque
Nord Grande Terre	Moyen
Sud Grande Terre	Faible
Désirade	Faible
Basse Terre (côte sud-est)	Fort
Les Saintes	Faible
Marie Galante	Faible

Prévisions pour les 4 prochains jours:

Analyse sur la zone Antilles:

Les images satellitaires du 7 au 9 septembre 2020 ont été analysées. La couverture nuageuse et la présence de fauchées de non-détection en rendent certaines difficilement exploitables. Toutefois celles du 7 et en partie celles du 9 sont assez exploitables. Dans l'est des îles du nord, au nord-est de l'île de Barbuda, de nombreux radeaux sont détectés. Un très long filament est poussé par le vent d'est au nord de la Guadeloupe. Il menace surtout l'île d'Antigua. Plusieurs radeaux disparates sont aussi pris dans le flux à l'est immédiat de l'archipel guadeloupéen. Plus au sud des radeaux sur le proche est de Sainte-Lucie remonte vers le sud de la Martinique, mais ils devraient très majoritairement passer en Mer des Caraïbes dans le canal entre les deux îles. Plus loin à plus de 130km au Sud-Est de La Martinique de très nombreux filaments font route vers les îles. Enfin les détections près des côtes de la Guyane sont anecdotiques.

Analyse autour de la Guadeloupe et prévisions pour les 4 prochains jours:

Les images du 9 septembre 2020 permettent une bonne vision des conditions autour de l'archipel guadeloupéen:

- Sur la côte Nord-Est de la Grande-Terre des échouements éparses sont en cours. D'autres devraient encore se produire en fin de période.
- Les Désirades, Marie-Galante et le Sud de la Grande-Terre devraient connaître une accalmie des échouements durant ces 4 prochains jours. Mais attention aux effets de la houle due aux phénomènes cycloniques qui dans un flux d'est plus renforcé pourrait accélérer l'arrivée de radeaux à proximité de ces îles en fin de période.
- Un large radeau est actuellement dans le Petit Cul-de-Sac marin. Il menace déjà les rivages des communes à l'ouest de lui. De façon plus éparses, quelques petits radeaux sont détectés entre Marie-Galante et Basse-Terre. Ils devraient échouer ici ou là sur la côte Est de la Basse-Terre durant les prochains jours.
- Quelques radeaux dans le canal des Saintes et d'autres (plus rares) dans celui de la Dominique, s'accrochent à la pointe sud de la Basse-Terre ou plus sporadiquement aux îles des Saintes durant ces prochaines 48h.


Tendance pour les 2 prochaines semaines :

Dans un très large secteur est de la Martinique, les algues devraient remonter doucement vers L'archipel guadeloupéen (vent faiblissant et gyre au large de la Martinique). Autour de la Barbade, de très nombreux radeaux de sargasses sont détectés. Entre Sainte-Lucie et la Barbade, ces radeaux seront repris par le courant des Antilles et pourront provoquer des échouements, d'abord en Martinique. Une petite partie pourra remonter jusqu'en Guadeloupe. Le passage des deux phénomènes cyclonique PAULETTE et RENE pourrait engendrer une houle d'est et amener plus rapidement les sargasses sur les côtes des petites Antilles. Plus au sud de la Barbade, là encore les détections sont nombreuses. La configuration faiblissante du courant des Antilles, devrait laisser le vent seul acteur du déplacement et les radeaux devraient gagner la mer des Caraïbes sans échouer sur la Martinique, ni la Guadeloupe.

Tendance pour les 2 prochains mois :

De nombreux filaments de sargasses sont actuellement entre Les Guyanes et La Barbade. Ils sont pris dans des gyres et poussés lentement par le vent vers les Antilles. D'autre plus au nord de La Guyane (500km) sont repris dans la boucle de réflexion et se dirige vers le continent africain. Une petite partie pourra tout de même être repris par la circulation dominante et venir aborder les côtes antillaises en fin de période. Il faut noter tout de même que les détections au niveau de l'équateur (zone de réservoir à sargasses), sont beaucoup moins nombreuses que précédemment. Ce qui permet de supposer une accalmie après les échouements à venir.

Image composite sur les 7 jours précédents :



Notice sur l'estimation du risque d'échouement:

La détection et la localisation des radeaux de sargasses autour de l'arc antillais sont réalisées par télédétection à moyenne et haute résolution après traitement spécifique des données issues des capteurs optiques embarqués suivants:

- MODIS (Satellite Aqua), à 1km et 250m de résolution
- OLCI (Satellite Sentinel 3A/3B) à 300m de résolution
- OLI (satellite Landsat-8) à 30m de résolution
- MSI (satellites Sentinel-2A/2B) à 10-30 m de résolution

Les trajectoires de dérive des radeaux de sargasses détectés sont calculées à partir du modèle de dérive de Météo-France MOTHY (Modèle Océanique de Transport d'Hydrocarbures), développé pour la lutte contre les pollutions accidentelles ou pour la gestion des opérations de recherche et de sauvetage.

Ce modèle simule le déplacement des nappes identifiées en prenant en compte l'effet combiné du frottement du vent de surface sur les sargasses et de l'advection par les courants marins.

Le modèle utilisé actuellement se base sur le modèle IFS du Centre Européen de Prévision pour le champ de vent et sur Mercator pour la courantologie.

Le risque d'échouage est estimé, sur une échelle de faible à très fort, à partir de la prévision de dérive et du nombre de bancs de sargasses atteignant la zone de surveillance littorale identifiée.

Un risque faible signifie que l'on observe très peu de nappes dérivantes et que les trajectoires de dérive calculées ne rencontrent pas le secteur côtier évalué. La probabilité d'échouages significatifs est ainsi jugée faible.

Le risque augmente en fonction du nombre et de la taille des nappes détectées et du taux de convergence des trajectoires de dérive calculées vers le secteur côtier concerné. Le risque très fort caractérise ainsi une probabilité d'échouage quasi assurée sur le secteur, mais également une grande quantité de nappes en approche.

Limites du dispositif de prévision:

En masquant partiellement la zone surveillée, la couverture nuageuse constitue la principale limite du dispositif de veille satellitaire. La qualité de l'information spatiale des bancs de sargasses alimentant les modèles de dérive en dépend donc fortement.

Un indice de confiance est ainsi établi sur la base du taux de couverture nuageuse autour du territoire concerné.

La chaîne de prévision actuelle ne permet pas d'estimer avec finesse la quantité d'algues susceptible de s'échouer. En effet, les résolutions et les traitements appliqués aux données satellitaires ne permettent pas d'apprécier précisément les volumes d'algues en jeu.

Le manque de connaissance fine des courants côtiers limite la localisation précise des sites d'échouages.

Les prévisions sont ainsi déclinées par grands secteurs côtiers, fréquemment exposés aux échouages lors des épisodes passés. Les autres secteurs côtiers, pas ou peu exposés, ne peuvent faire l'objet d'une expertise en l'état des connaissances actuelles.