


Bulletin de surveillance et de prévision d'échouement des sargasses pélagiques pour la Guadeloupe

Lundi 22 Mars 2021

Carte de risque d'échouement pour les 4 prochains jours :



Indice de confiance : 4 /5

Zone	Estimation du Risque
Nord Grande Terre	Moyen
Sud Grande Terre	Moyen
Désirade	Fort
Basse Terre (côte sud-est)	Fort
Les Saintes	Fort
Marie Galante	Fort

Prévisions pour les 4 prochains jours:

Analyse sur la zone Antilles:

Très belle image le 21 mars. Les abords des îles françaises sont chargés de sargasses. Toutes sont concernées. Les détections sont nombreuses autours de la Guadeloupe et de la Martinique, mais aussi aux abords de Saint Barthélemy et Saint-Martin.

Analyse autour de la Guadeloupe:


L'image du 21/03/2021 montre dans un rayon de 400 km autour de la Guadeloupe et de ses dépendances, de très nombreux radeaux de sargasses.

Des échouements réguliers sont prévus tout au long de la période. On peut noter que les Saintes, la côte est de la Basse-Terre le sud de la Grande-Terre, ainsi que le nord de la Grande-Terre et la Désirade seront les premiers à voir s'échouer les algues. Le nord de la Grande-Terre devrait être moins concerné par les échouements au fil de l'échéance, car le courant des Antilles qui se renforce va limiter la progression des sargasses sur cette zone.

Marie-Galante est plutôt concernée par les sargasses prises dans le gyre qui s'étend au large de la Guadeloupe à la Martinique. Les échouements les plus importants sont attendus en fin de période.

Tendance pour les 2 prochaines semaines :

Durant les deux prochaines semaines, il faut s'attendre encore à des arrivages. En effet, les détections sont nombreuses. Autant aux abords de la Barbade, qu'à l'Est sur le proche Atlantique, ainsi qu'à l'Est des Grenadines et de Trinidad et Tobago, les algues sont nombreuses et pourront se diriger vers nos îles.




Remarque : voir commentaires dans la notice en fin de bulletin

Tendance pour les 2 prochains mois :

La zone équatoriale en sortie d'Amazonie est visible, et les algues commencent à s'y accumuler. Le courant des Guyanes lui aussi est chargé de nombreux radeaux. Il y en a encore à l'Est des Antilles qui pourront nous concerner à échéance des 2 prochains mois. La saison des échouements ne fait donc que commencer !

Image composite sur les 7 jours précédents :



Notice sur l'estimation du risque d'échouement:

La détection et la localisation des radeaux de sargasses autour de l'arc antillais sont réalisées par télédétection à moyenne et haute résolution après traitement spécifique des données issues des capteurs optiques embarqués suivants:

- MODIS (Satellite Aqua), à 1km et 250m de résolution
- OLCI (Satellite Sentinel 3A/3B) à 300m de résolution
- OLI (satellite Landsat-8) à 30m de résolution
- MSI (satellites Sentinel-2A/2B) à 10-30 m de résolution

L'acquisition et le traitement des données satellites sont réalisés par la société CLS (Collecte Localisation Satellite)

Les trajectoires de dérive des radeaux de sargasses détectés sont calculées à partir du modèle de dérive de Météo-France MOTHY (Modèle Océanique de Transport d'Hydrocarbures), développé pour la lutte contre les pollutions accidentelles ou pour la gestion des opérations de recherche et de sauvetage.

Ce modèle simule le déplacement des nappes identifiées en prenant en compte l'effet combiné du frottement du vent de surface sur les sargasses et de l'advection par les courants marins. Le modèle utilisé actuellement se base sur le modèle IFS du Centre Européen de Prévision pour le champ de vent et sur Mercator pour la courantologie.

Le risque d'échouement est estimé, sur une échelle de faible à très fort, à partir de la prévision de dérive et du nombre de bancs de sargasses atteignant la zone de surveillance littorale identifiée.

Un risque faible signifie que l'on observe très peu de nappes dérivantes et que les trajectoires de dérive calculées ne rencontrent pas le secteur côtier évalué. La probabilité d'échouements significatifs est ainsi jugée faible.

Le risque augmente en fonction du nombre et de la taille des nappes détectées et du taux de convergence des trajectoires de dérive calculées vers le secteur côtier concerné. Le risque très fort caractérise ainsi une probabilité d'échouement quasi assurée sur le secteur, mais également une grande quantité de nappes en approche.

Limites du dispositif de prévision:

En masquant partiellement la zone surveillée, la couverture nuageuse constitue la principale limite du dispositif de veille satellitaire. La qualité de l'information spatiale des bancs de sargasses alimentant les modèles de dérive en dépend donc fortement. Un indice de confiance est ainsi établi sur la base du taux de couverture nuageuse autour du territoire concerné.

La chaîne de prévision actuelle ne permet pas d'estimer avec finesse la quantité d'algues susceptible de s'échouer. En effet, les résolutions et les traitements appliqués aux données satellitaires ne permettent pas d'apprécier précisément les volumes d'algues en jeu.

Le manque de connaissance fine des courants côtiers limite la localisation précise des sites d'échouement. Les prévisions sont ainsi déclinées par grands secteurs côtiers, fréquemment exposés aux échouements lors des épisodes passés. Les autres secteurs côtiers, pas ou peu exposés, ne peuvent faire l'objet d'une expertise en l'état des connaissances actuelles.

Commentaires sur la carte "Vecteurs de dérives":

Les vecteurs représentent la dérive calculée par le modèle de dérive "MOTHY", ils combinent donc l'action du courant et du vent. A cette carte de vecteur se superposent les principaux bancs de sargasses détectés par les satellites moyenne résolution (OLCI/MODIS) des 3 jours précédents. En cas de bonne couverture satellite sur la période, il est possible qu'un même banc soit observé plusieurs fois d'un jour à l'autre.