


## Bulletin de surveillance et de prévision d'échouement des sargasses pélagiques pour la Guadeloupe

**Lundi 11 Juillet 2022**

**Carte de risque d'échouement pour les 4 prochains jours :**



**Indice de confiance : 2 /5**

Zone	Estimation du Risque
Nord Grande Terre	Moyen
Sud Grande Terre	Faible
Désirade	Moyen
Basse Terre (côte sud-est)	Moyen
Les Saintes	Moyen
Marie Galante	Faible

## **Prévisions pour les 4 prochains jours:**

### **Analyse sur la zone Antilles / Guyane:**

Les images satellites du 7 au 10 juillet ont servi à l'analyse. Des nuages et des fauchées satellitaires sur les Antilles rendent délicates les détections. A la faveur de trouées, on retrouve beaucoup de sargasses en Atlantique à l'est des Îles du Nord et de la Guadeloupe dans les 350 premiers km des côtes. Toujours dans les trouées, des détections sont faites jusqu'à plus de 500 km des côtes de la Martinique. Et on en retrouve vers le sud entre les Grenadines et la Barbade et de gros chapelets à l'est et au sud-est de la Barbade. Pour la Guyane, des filaments transitent au large à environ une centaine de km des côtes. Et des algues disparates sont détectées au large de l'embouchure de l'Amazone

### **Analyse et prévision autour de la Guadeloupe:**

#### **Des arrivages plus ou moins ponctuels sont en cours et vont se poursuivre localement.**

Entre fauchées, nuages et brumes de sables, seules les images du 7 et partiellement celles du 9 sont exploitables pour les détections autour de notre archipel.

Des radeaux sont pris dans un gyre de grosse taille centré à environ 100 km au nord-est de la Désirade. La majeure partie des algues de cette zone est donc rejeté vers les îles plus au nord. Toutefois les filaments sont visibles à proximité des côtes au nord-est de la Grande-Terre. Des arrivages sont en cours ponctuellement sur ce littoral et vont encore se poursuivre durant les 4 prochains jours.


Plus au sud, des radeaux sont visibles le long de la côte Est de la Basse-Terre, d'autres entre celle-ci et Marie-Galante. Ces radeaux vont encore alimenter, durant la période, les échouements le long de la côte exposée au flux de la Basse-Terre voire dans le Petit-Cul de Sac.

Enfin des filaments sont détectés dans les deux canaux des Saintes et de la Dominique surtout à proximité des deux îles saintoises. Il reste une source probable d'échouement pour les deux îles surtout sur les rivages exposés au flux d'est à sud-est.

## Tendance pour les 2 prochaines semaines :

**L'est des Petites-Antilles reste chargé et les arrivages vont continuer ces deux prochaines semaines.**

On retrouve à l'est et au sud de la zone Antilles, de nombreux radeaux, filaments et amas, jusqu'à un peu plus de 300 km des côtes et la couverture nuageuse peut en cacher d'autre. Ces algues sont prises dans des gyres ou des méandres de surface qui les éloignent ou les ralentissent dans leur progression vers les côtes. Des chapelets d'algues détectés entre les Grenadines et l'est de la Barbade sont prises dans des courants de nord à nord-ouest qui les ramènent vers les Antilles pour les quinze prochains jours.



**Remarque :** voir commentaires dans la notice en fin de bulletin

## Tendance pour les 2 prochains mois :


**nous sommes au cœur de la saison des sargasses**

Nous sommes au cœur de la saison des sargasses. Le bassin est couvert d'amas, filaments et radeaux de l'équateur aux côtes antillaises. Il faut s'attendre encore à des échouements tout au long des mois de juillet et août. Climatologiquement, les échouements diminuent en septembre pour disparaître en octobre.

### Image composite sur les 7 jours précédents :

**Image Composite 7j - OLCI (sentinel3)**

**Date : 2022-06-21 UTC**



## Notice sur l'estimation du risque d'échouement:

La détection et la localisation des radeaux de sargasses autour de l'arc antillais sont réalisées par télédétection à moyenne et haute résolution après acquisition et post-traitement spécifique des données issues des capteurs optiques embarqués suivants:

- MODIS (Satellites Aqua et Terra) à 1km de résolution
- OLCI (satellites Sentinel 3A/3B) à 300m de résolution
- MSI (satellites sentinel-2A/2B) à 10-30 m de résolution

Les trajectoires de dérive des radeaux de sargasses détectés sont calculées à partir du modèle de dérive de Météo-France MOTHY (Modèle Océanique de Transport d'Hydrocarbures), développé pour la lutte contre les pollutions accidentelles ou pour la gestion des opérations de recherche et de sauvetage.

Ce modèle simule le déplacement des nappes identifiées en prenant en compte l'effet combiné du frottement du vent de surface sur les sargasses et de l'advection par les courants marins. Le modèle utilisé actuellement se base sur le modèle IFS du Centre Européen de Prévision pour le champ de vent et sur Mercator pour la courantologie.

Le risque d'échouement est estimé, sur une échelle de faible à très fort, à partir de la prévision de dérive et du nombre de bancs de sargasses atteignant la zone de surveillance littorale identifiée.

Un risque faible signifie que l'on observe très peu de nappes dérivantes et que les trajectoires de dérive calculées ne rencontrent pas le secteur côtier évalué. La probabilité d'échouements significatifs est ainsi jugée faible.

Le risque augmente en fonction du nombre et de la taille des nappes détectées et du taux de convergence des trajectoires de dérive calculées vers le secteur côtier concerné. Le risque très fort caractérise ainsi une probabilité d'échouement quasi assurée sur le secteur, mais également une grande quantité de nappes en approche.

### Limites du dispositif de prévision:

En masquant partiellement la zone surveillée, la couverture nuageuse constitue la principale limite du dispositif de veille satellitaire. La qualité de l'information spatiale des bancs de sargasses alimentant les modèles de dérive en dépend donc fortement. Un indice de confiance est ainsi établi sur la base du taux de couverture nuageuse autour du territoire concerné.

La chaîne de prévision actuelle ne permet pas d'estimer avec finesse la quantité d'algues susceptible de s'échouer. En effet, les résolutions et les traitements appliqués aux données satellitaires ne permettent pas d'apprécier précisément les volumes d'algues en jeu.

Le manque de connaissance fine des courants côtiers limite la localisation précise des sites d'échouement. Les prévisions sont ainsi déclinées par grands secteurs côtiers, fréquemment exposés aux échouements lors des épisodes passés. Les autres secteurs côtiers, pas ou peu exposés, ne peuvent faire l'objet d'une expertise en l'état des connaissances actuelles.

### Commentaires sur la carte "Vecteurs de dérives":

Les vecteurs représentent la dérive calculée par le modèle de dérive "MOTHY", ils combinent donc l'action du courant et du vent. A cette carte de vecteur se superposent les principaux bancs de sargasses détectés par les satellites moyenne résolution (OLCI/MODIS) des 3 jours précédents. En cas de bonne couverture satellite sur la période, il est possible qu'un même banc soit observé plusieurs fois d'un jour à l'autre.